

Aus der Chirurgischen Universitätsklinik zu Göttingen
Direktor: Prof. Dr. R. Stich

Der Hallux valgus
mit besonderer Berücksichtigung
der Spätergebnisse von 100 operierten Fällen

INAUGURAL-DISSERTATION

zur
Erlangung der Doktorwürde
der Medizinischen Fakultät
der Georg-August-Universität zu Göttingen

vorgelegt von

HEINZ BARTHOLOMAUS
aus Görsbach (Prov. Sachsen)

Göttingen 1940

Aus der Chirurgischen Universitätsklinik zu Göttingen
Direktor: Prof. Dr. R. Stich

Der Hallux valgus

mit besonderer Berücksichtigung
der Spätergebnisse von 100 operierten Fällen

INAUGURAL-DISSERTATION

zur
Erlangung der Doktorwürde
der Medizinischen Fakultät
der Georg-August-Universität zu Göttingen

vorgelegt von

HEINZ BARTHOLOMÄUS

aus Görsbach (Prov. Sachsen)

Göttingen 1940

Dekan: Prof. Dr. E. Krantz.

Berichterstatter: Dozent Dr. Herlyn.

Miterstatter: Prof. Dr. R. Stich.

Mündliche Prüfung: Oktober 1939.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA40154001_0370

Es ist wohl Tatsache, daß der Hallux valgus erst nach jahrelangem Bestehen einer ärztlichen Behandlung zugeführt wird. Das mag darauf zurückzuführen sein, daß einerseits durch diese Fehlförmigkeit in leichteren bis mittleren Graden meist keine ernstlichen Beschwerden verursacht werden, andererseits darauf, daß dem Laien die Einsicht für das Vorliegen einer ernstlichen Störung fehlt und sich das entstellende Bild im Schuh sehr leicht verdecken läßt. Der Arzt bekommt den Hallux valgus meist erst zur Behandlung, wenn der Druck des Stiefels in der Ballengegend schmerzhaft ist und wieder Entzündungserscheinungen im Bereiche des Grundgelenks eingestellt haben. Neben diesen Erscheinungen klagen dann die Kranken bei vorhandenem Spreizfuß meist noch über Schmerzen unter der Fußsohle oder bei gleichzeitigem Knick-Plattfuß über die üblichen Plattfußbeschwerden.

Beim Hallux valgus, der häufigsten Zehenverbildung, handelt es sich um eine Abknickung der großen Zehe im Grundgelenk nach außen. Diese Verbildung des Hallux valgus ist nach vielen zahlenmäßigen Übersichten ein sehr verbreitetes und häufiges Leiden. Nach Payr leiden 25 % und nach Forsten-Sandelin sogar 30 % aller Menschen daran. Bei Frauen ist diese Verbildung häufiger als bei Männern.

Die Entstehungsursache des Hallux valgus hat bisher noch keine einheitliche Erklärung gefunden. In früheren Zeiten führte man die Entstehung des Hallux valgus hauptsächlich auf unzureichende Fußbekleidung zurück. Diese bisher vertretenen Ansichten über die Entstehungsweise kann man heute in zwei verschiedene Gruppen einteilen. Die erste Gruppe sucht die Hallux-valgus-Bildung aus den ersten Veränderungen im Zehengrundgelenk zu erklären, die zweite sieht die Verlagerung des ersten Mittelfußknochens als das Grundlegende an. Als Vertreter der ersten Gruppe, die den Hallux valgus als reine Belastungsverbildung ansieht, kann man Payr und Ludloff nennen.

Ludloff machte an normalen Füßen und an solchen mit Hallux-valgus-Bildung folgende Beobachtung. Er untersuchte den ruhenden, unbelasteten Fuß und den belasteten und fand dabei, daß bei der Belastung des Fußes die Mittelfußknochen fächerförmig auseinanderweichen. Die Zehen spreizen sich und stellen sich genau in Richtung der Mittelfußknochen ein, so daß sich bei einem normalen Fuß die Großzehe genau nach der Längsachse des ersten Mittelfußknochens richten muß. Es treten also eine Verbreiterung der Querachse der Zehengrundgelenke, ein Auseinanderweichen und eine Streckung der Zehen ein. Ohne diese drei Bewegungsmöglichkeiten soll kein federnder Gang und auch keine besondere Leistungsfähigkeit des Fußes vorhanden sein. Fehlt diese Möglichkeit dieser fächerförmigen Verbreiterung der Mittelfußknochen in der Querachse, wird bei starker

Belastung und nach längerer Zeit sowohl an der Innenseite des ersten Mittelfußköpfchens, wie auch an der Außenseite des fünften Mittelfußknochens ein starker Druckschmerz empfunden. Infolge dieses vermehrten Druckes entwickeln sich am ersten Mittelfußknochen ein Schleimbeutel, am fünften eine empfindliche Schwièle. Fehlt die fächerförmige Verbreiterungsmöglichkeit der Zehen am belasteten Fuß dann nimmt die große Zehe die Valgusstellung ein. Ist schließlich keine Streckungsmöglichkeit für die Zehen vorhanden, geraten sie in „Kontrakturstellung“.

Sobald irgendeine Fußbekleidung eine dieser drei angeführten Bewegungsmöglichkeiten einschränkt oder aufhebt, muß eine Verbildung wie der Hallux valgus entstehen. Als Fußbekleidung kommen hier sowohl der Schuh als auch der Strumpf in Frage. Die Wirkungen des Strumpfes auf den Fuß gestalten sich meist derartig, daß sie die Spreizungsmöglichkeit der Zehen verhindern. Da der Strumpf, der fast immer vorn spitz zuläuft, glatt und straff sitzen soll, wird er unter einem dauernden Zug gehalten. Dies bleibt natürlich nicht ohne Folgen für die Großzehe. So soll bereits der Strumpf, wenn er zu eng und zu straff angezogen und festgehalten wird, eine allmähliche Valgusstellung der großen Zehe und eine Hammerzehbildung der übrigen Zehen verursachen. Es müßte daher jeder Strumpf, wenn er gut passen und keine Behinderung der Bewegungsmöglichkeiten der Zehen herbeiführen soll, die vorderen Abschnitte bei belastetem Fuß etwas überragen, jedoch an der Ferse und im Mittelfuß fest anschließen.

Bei den so häufig angeschuldigten, verkehrt gebauten Schuhen ist es besonders der spitze Schuh, der als eigentliche Ursache der Hallux-valgus-Bildung angesehen wird. Die Hauptsache bei einem spitzen Schuh, um keinen Hallux valgus zu verursachen, ist die Länge des Schuhes. Er soll mindestens 1—2 cm länger als der belastete Fuß sein, die Spitze nach innen verschoben sein, so daß der innere Sohlenrand parallel dem Mittelfußknochen verläuft und die Spitze des Fußes nicht direkt in der Mitte des Schuhes liegt.

Fehlt bei einem breiten Schuh dagegen die Geräumigkeit, so daß die Großzehe bei Belastung und beim Abwickeln des Fußes sich nicht in die Verlängerung des ersten Mittelfußknochens einstellen kann, wird selbst der breiteste Schuh wie ein zu kurzer wirken. Die Folge davon ist eine Valgusstellung der großen Zehe und eine Hammerzehbildung der übrigen Zehen. Als besonders verhängnisvoll wären noch die Damenschuhe mit sehr hohen Absätzen zu erwähnen. Hier ruht der Fuß auf einer schiefen Ebene. Dabei wird der vordere Fußabschnitt dauernd zusammengedrückt und kann so die Verbildung sehr leicht verursachen.

Diese Wirkungen der schlecht gebauten Schuhe ergeben mit den Wirkungen des Strumpfes sehr oft das Bild der Hallux-valgus-Verbildung. Die Häufigkeit der Hallux-valgus-Verbildungen bei Frauen gegenüber Männern ist schließlich in der ungeeigneteren Fußbeklei-

ding der ersteren zu suchen. Auch vom Salis schreibt in seiner Arbeit, daß das vermehrte Vorkommen dieser Verbildung bei Frauen in der ungesünderen Fußbekleidung begründet ist.

Als Vertreter der zweiten Gruppe, die die Verlagerung des ersten Mittelfußknochens als das Erstere ansieht, sind Ewald und der Amerikaner Joung zu nennen. Ewald untersuchte eine große Anzahl von Kranken und stellte auf Grund seiner eingehenden Untersuchungen folgende Theorie auf. Er nimmt als Ursache der Hallux-valgus-Verbildung die Verlagerung des ersten Mittelfußknochens an, die durch die veränderte Verlaufsrichtung des ersten Mittelfuß-Keilbeingelenkes hervorgerufen wird. Beim Vergleich mit normalen Füßen fand er nämlich, daß der Gelenkspalt zwischen dem ersten Mittelfußknochen und Keilbein infolge besonderer Gestaltung des letzteren nicht eine quere Verlaufsrichtung habe, sondern eine schräge. Nach seiner Anschauung soll dem Keilbein ein Keil aufsitzen, der diesen eigentümlichen Verlauf des ersten Mittelfußknochens mehr oder weniger stark verursacht. Dieser Keil soll zunächst als selbständiges Knochenstück, dem Os intermetatarsale von Dwight entsprechend vorhanden sein, später aber mit dem Keilbein verschmelzen. Auch der Amerikaner Joung sieht die Verlagerung des ersten Mittelfußknochens als die eigentliche Entstehungsursache des Hallux valgus an.

Ewald führt als Beweis seiner Theorie die Erblichkeit an, die man in einigen Fällen beobachtet hat. Außerdem nimmt er genau wie Payr als Entstehungszeit des Hallux valgus das jugendliche Alter an. Andererseits gibt er auch zu, daß die Verbildung durch falsche Fußbekleidung gefördert werden kann.

In den letzten Jahren sind unsere Anschauungen über die Entstehungsursache des Hallux valgus durch die Arbeiten Hohmanns wesentlich beeinflußt worden. Hohmann gibt mehrere Ursachen an, die gelegentlich zur Bildung eines Hallux valgus führen können: Verletzungen, Krankheiten des Zentralnervensystems, bei denen Muskelgruppen gelähmt werden und ihre entgegengesetzt wirkenden Muskeln überwiegen, eine chronische Verbildung des Großzehengelenkes. Ein angeborener Hallux valgus ist nach Hohmann selten und dann meist auf unregelmäßige Anlage der Knochenkeime zurückzuführen.

Abgesehen von den angeführten gelegentlichen Ursachen kommt nach Ansicht Hohmanns dem in der großen Mehrzahl der Fälle vorhandenen Platt- und Spreizfuß eine ausschlaggebende Bedeutung für die Entstehung des Hallux valgus zu. Der erworbene Hallux valgus ist meist auf eine „konstitutionelle Veranlagung“ zurückzuführen. Es ist nicht die Erkrankung eines einzelnen Gelenks, sondern ein Glied in der Kette anderer Formveränderungen. Er ist oft verbunden mit Platt- und Spreizfußerscheinungen, anderen Zehenverbildungen und unverhältnismäßig langen Füßen. Er ist eine Belastungsverbildung, die als Unzulänglichkeitserscheinung hauptsächlich entsteht, wenn Knochen, Bänder und Muskeln dem dauernden Druck der Belastung nicht gewachsen sind.

Bei der Belastung haben die Mittelfußknochen die Neigung fächerförmig auseinanderzugehen. Kräftige Muskulatur und ein straffer Bandapparat hindern sie daran. Bei Bänder- und Muskelschwäche wird dieser Widerstand bald überwunden. Es entsteht der Spreizfuß. Die Sehne des M. abd. hall. wird gedehnt oder rutscht nach der Fußsohle zu ab.

Beim Platt-Spreizfuß geht man mit auswärts gerichteten Fußspitzen. Der Fuß wird über den inneren Fußrand abgewickelt. Der Bodendruck, der der Körperlast entgegenwirkt, drängt die Zehe nach außen ab. Der erste Mittelfußknochen wird aufgehoben und „superniert“, was wieder eine „Pronation“ der Großzehe zur Folge hat. Ist die Zehe aber einmal abgeglitten, dann wirken Bodendruck und fehlerhafte Abwicklung weiter verschlimmernd und ebenso die Muskeln des ersten inneren Fußstrahles. Vor allem ist es der M. abd. hall. der seine Tätigkeit nicht mehr ausüben kann, wenn seine Ansatzsehne von der Innenseite des Gelenkes nach der Fußsohle zu abgerutscht. Hierbei zieht er die Gelenkkapsel mit und führt eine Verdrehung derselben herbei. Dadurch verschieben sich auch die übrigen Muskeln nach außen, namentlich der M. add. hall. und der M. flex. brev., dieser wieder zieht die Sesambeine nach außen. Je mehr der M. abd. hall. ausfällt, desto mehr bekommt der kräftige M. add. hall. das Übergewicht und verstärkt die Valgusstellung. Auch der M. ext. hall. spielt für die Verschlimmerung eine wesentliche Rolle. Ist seine Sehne nicht stark befestigt ist, wird sie nach außen verlagert. Dadurch tritt eine Verkürzung der Sehne ein, der Muskel verkürzt sich und wirkt in dieser veränderten Stellung weiter Hallux-valgus fördernd. Diese Wirkung wird noch verstärkt, wenn gleichzeitig eine Drehung der Zehe nach oben besteht.

Die Entstehungsursache des Hallux valgus erscheint uns durch die Hohmannsche Theorie weitgehend geklärt. Man wird allerdings feststellen, daß in einem kleinen Teil die wichtigste Voraussetzung für die Hohmannsche Erklärung, ein Platt-Spreizfuß, nicht immer nachweisbar ist. So fand ich bei meinen Nachuntersuchungen z. B. bei einigen Männern und Frauen mit hohem Längsgewölbe und rege rechter Stellung des Fußes zum Unterschenkel einen hochgradigen Hallux valgus. Einige Kranke hatten normale Quer- und Längsgewölbe, jedoch einen stark ausgeprägten Hallux valgus.

Das Vorkommen von angeborenen, auch manchmal vererbten Fällen wird in der Literatur erwähnt, jedoch für äußerst selten gehalten. Bei meinen Nachuntersuchungen fand ich zwei Fälle, bei denen angeblich ein angeborener Hallux valgus vorliegen soll. Für deren Entstehung dürfte eine fehlerhafte Keimanlage oder eine Knochenmißbildung des Großzehengrundgelenkes anzunehmen sein.

Matheis nimmt im großen und ganzen die gleiche Entstehungsursache an, wie eben ausgeführt. Auch nach seiner Auffassung geht der Hallux valgus stets mit einem Knick-Spreizfuß einher und entsteht unter bestimmten Umständen gleichzeitig mit dieser Abweichung

erdings glaubt er, daß der Vorverlagerung des Ansatzes der Sehne s Tibialis anterior am ersten Mittelfußknochen, die er nur an ichen mit Hallux valgus fand, und dem Vorhandensein eines hoch- wölbten Tragbogens (hohem Rist) größte Bedeutung zukommen. m bei hochgewölbtem Fuß, auch wenn er nur durch hohen Ab- z hochgestellt ist, werden nach seiner Ansicht die vorderen Stütz- kte des Fußes der Richtung des Unterschenkels nähergebracht l so erhöhter Belastung zugeführt. Bei Schwäche der queren Bin- g kommt es dann sehr leicht zum Spreizfuß und Hallux valgus.

Das Krankheitsbild des Hallux valgus wird also heute in erster ie „als Teilerscheinung des Plano valgus und Transversoplanus“ gefaßt. Beide, sowohl der Platt-Spreizfuß als auch der Hallux gus, sind Folgeerscheinungen einer Gewebsschwäche des Stütz- webes. Jedoch darf man keineswegs die verhängnisvollen Wirkun- der fehlerhaften Fußbekleidung vernachlässigen.

Wenn nun die Fehlstellung des Hallux valgus durch das gestörte skelgleichgewicht längere Zeit bestanden hat, so kommt es zu teren Veränderungen im Bereiche der Haut, der Kapsel und des behens, die dann durch die verursachten Beschwerden die Kran- endlich zum Arzt führen.

Durch das Hervortreten des Köpfchens des ersten Mittelfuß- chens entsteht der sogenannte Ballen, der besonders im Winter als ostballen“ den Kranken große Beschwerden macht. Hinzu kommen ige Schwielen sowie ein durch den Schuhdruck sich entwickelnder leimbeutel, der vereitern und zur Fistelbildung führen kann. Weiter wickelt sich im Laufe der Zeit ein unregelmäßiger, aufgefaserter rpelüberzug am Kopfteil des ersten Mittelfußknochens, der nicht r mit dem Zehengrundglied in Gelenkverbindung steht.

Neben dem Vorspringen des ersten Mittelfußköpfchens, das i als „Exostose“ bezeichnet hat, kommt es meist zu einem wirk- en Knochenwulst durch knöcherne Verdickung infolge Reibung Knochenhautreizung im Schuh. Dieser Knochenwulst hebt sich dem noch in Gelenkbeziehung stehenden äußeren Teil des Mittel- köpfchens durch eine von oben nach unten verlaufende Furche ab, durch Druck und Reibung des inneren Randes des Großzehen- dgliebes entstanden ist. Diese ist bei älteren Fällen so tief ge- den, daß das Zurückführen der großen Zehe in die normale Lage t möglich sein kann. Ein anderes wichtiges Hindernis ist die all- lich geschrumpfte äußere Kapsel des Grundgelenkes, worauf Payr erster hingewiesen hat, und weiter, wie Schede besonders hervor- , der geschrumpfte Adduktor hallucis und der äußere Kopf des r hallucis brevis. Ein wenig beachtetes Hindernis für das rückbringen in die natürliche Lage ist auch die Spannung und rumpfung der Haut zwischen großer und zweiter Zehe, die dadurch teht, daß die übrigen Zehen, insbesondere die zweite, durch den lux valgus meist ebenfalls in eine nach außen gerichtete Abspreiz- ung gedrängt sind.

Die Entwicklung des Hallux valgus wird von den meisten in das jugendliche Alter verlegt, wo sich vielfach die ersten Beschwerden einstellen. Denn gerade in diesem Alter macht sich „das Mißverhältnis zwischen Belastung und Widerstandskraft auch an anderen Stellen der unteren Gliedmaßen“ bemerkbar. In manchen Fällen entwickelt er sich schon im Kindesalter, in anderen erst im hohen Alter, wo die Tragfähigkeit des Fußes nachläßt, das Körpergewicht jedoch zunimmt.

Das Röntgenbild zeigt uns schließlich noch einige Veränderungen, die zum Teil äußerlich nicht sichtbar sind. Am auffälligsten ist neben der nach außen abgespreizten Großzehe die Verlagerung des ersten Mittelfußknochens nach innen, verbunden mit einer unnatürlichen Gelenkverbindung im Mittelfuß-Großzehengrundgelenk, wobei das Köpfchen des ersten Mittelfußknochens innen nicht mehr mit dem ersten Großzehengrundglied in Gelenkverbindung steht. Auch der sogenannte und wirkliche Knochenwulst ist im Röntgenbild gut zu sehen. Ferner zeigt sich eine Verschiebung der Sesambeine nach außen. Sie liegen normal unter dem ersten Mittelfußköpfchen zu beiden Seiten der Flexor-hallucis-longus-Sehne, teilweise mit dieser verwebt und durch ein festes Band untereinander verbunden. Sie treten mit dem in seiner Verlaufs- und Zugrichtung veränderten Flexor hallucis longus seitlich zwischen den Köpfchen des ersten und zweiten Mittelfußknochens hervor.

Kommen Kranke mit einem ausgeprägten Hallux valgus zur Behandlung, so hören wir außer evtl. bestehenden Knick-Spreizfuß- und Plattfußbeschwerden Klagen über den „Ballen“ oder die „Frostbeule“ und darüber, daß die Abwicklung des Fußes erschwert, ja unmöglich sei und die Standfestigkeit fehle. Um diese Beschwerden zum Verschwinden zu bringen, muß der Hallux valgus, wenn möglich mit seiner Ursache, beseitigt werden.

Viele unblutige Behandlungen zur Beseitigung des Hallux valgus zielen darauf ab, seine Ursache, die Fußsenkung und den Spreizfuß zu beseitigen, d. h. also Plattfuß- bzw. Spreizfüßeinlagen zu verordnen bzw. den Plattfuß zurückzubilden. Eine genügende Beseitigung des Hallux valgus ist mit dieser Behandlung natürlich nur in den seltenen Fällen möglich, wo der Hallux valgus noch nicht die beschriebenen Muskel-, Knochen- und Gelenkveränderungen, insbesondere die Muskel- und Kapselschrumpfung gemacht hat, also erst eine kurze Zeit besteht. Schede zeigte 1923 auf dem deutschen Orthopädenkongreß an Hand eines Falles, daß der Hallux valgus nur durch Zurückbildung des Plattfußes zu beheben ist, womit er zugleich die Richtigkeit der angenommenen Ursache des Hallux valgus nachwies. Timmer verlangt für die unblutige Beseitigung des Hallux valgus, daß man den ersten Mittelfußknochen noch in die natürliche Lage zurückführen kann. Diese Forderung aufzustellen ist nicht notwendig; denn es hat sich gezeigt, daß in den meisten Fällen sowohl bei der unblutigen als auch bei der

blutigen Behandlung (ohne Kapseldurchtrennung im Mittelfuß-Keilbeingelenk) die Aufhebung der falschen Stellung des Mittelfußknochens durch Druck auf dessen Köpfchen leicht zu beseitigen ist.

Durch Filz- und Ballenschutzringe oder ähnliches Material kann man häufig die so lästigen Beschwerden durch den dauernden Stiefeldruck oder die von Schwielen und Schleimbeuteln herrührenden Schmerzen „für eine gewisse Zeit“ beheben. Weiter sind zur allmählichen Beseitigung der Valgusstellung der Großzehe eine ganze Reihe von Apparaten empfohlen worden. Ich führe hier nur einige an, nämlich die „Redressionsschiene von Hempel“, die Scherenschiene von Schede und die Ballensohle von Salis. Durch diese und ähnliche Apparate können die Fälle behandelt werden, bei denen noch ein beweglicher Hallux valgus vorliegt. Bragard hat ebenfalls an einem größeren Material mit unblutiger Behandlung nur in 10 % Mißerfolge gesehen. In schweren Fällen allerdings hat diese Behandlung nach seiner Meinung versagt. Schließlich hat Schede für derartige Fälle gezeigt, daß „allein durch regelrechte Umformung des gleichzeitig bestehenden Pes valgus und transversoplanus eine völlige Geraderichtung der Großzehe und durch entsprechende Einlagen eine Heilung des Gesamtleidens erzielt werden kann“.

Es wird für die überwiegende Mehrzahl der Fälle von Hallux valgus nur die blutige Behandlung in Frage kommen. Eine Einteilung der blutigen Behandlungsverfahren in drei Gruppen, die wir auch hier beibehalten wollen, hat Wymer aufgestellt, und zwar ist diese Gruppierung aufgestellt nach den Stellen, an denen die Eingriffe stattfinden. Zur ersten Gruppe gehören alle Behandlungsverfahren, die eine Besserung durch die Wiederherstellung des Muskelgleichgewichtes und Geraderichtung mittels Bandapparates erstreben. Hier sind zu nennen die Verfahren von König, Lexer, Wymer, Chlumsky, Schede, Haß.

Die zweite Gruppe umfaßt alle Eingriffe am Knochen, mit einer Unterteilung in a) Eingriffe mit der Öffnung des Gelenkes und b) ohne dieselbe. Die Verfahren von Hüter, Mayo, Hertzberg, Payr, Mühsam und Feßler sind als Beispiele für die erste Untergruppe zu nennen, für die zweite Kocher, Rath, Chlumsky, Hohmann, Riedel, Payr, Bragard, Hackenbroch, Ludloff, Schotte und Kotzenberg.

In der dritten Gruppe endlich sind alle an Sehnen und Knochen „kombinierten“ Eingriffe enthalten. Ich erwähne Ullmann, Alsberg, v. Salis und Mattheis.

Es sei noch einmal kurz hervorgehoben, daß sich die Verbildung des Hallux valgus in folgendem offenbart:

1. Ablenkung der großen Zehe nach der Kleinzehenseite hin, so daß sie mit der Achse des Fußes einen Winkel bildet und in schweren Fällen sogar mit ihrer Spitze über oder unter der zweiten Zehe liegt.
2. Ballenbildung an der Innenseite Fußes in der Höhe des Großzehengrundgelenkes.

3. Chronisch-entzündliche Veränderungen der den Ballen bedeckenden Haut.
4. Mehr oder weniger große Schmerzhaftigkeit der Gegend des Großzehengrundgelenkes sowie des ganzen Fußes.
5. Verbreiterung des Vorderfußes.
6. Verlagerung der Streck- und Beugesehnen.

Aus dem Röntgenbild lassen sich folgende Veränderungen erkennen:

7. Abspreizung der Großzehe nach außen.
8. Verlagerung des ersten Mittelfußknochens nach innen.
9. Nach außen verschobene Gelenkverbindung im Mittelfuß-Großzehengrundgelenk.
10. Verlagerung der Sesambeine nach außen.

All diese angeführten Veränderungen bei der Hallux-valgus-Verbildung sind bei der blutigen Behandlung desselben genauestens zu berücksichtigen und soweit es eben möglich ist in ihre normale Lage zurückzubringen.

Eine kurze Übersicht über die wichtigsten blutigen Behandlungsverfahren des Hallux valgus zeigt, daß bereits im Jahre 1877 Hue-ter die Entfernung des ersten Mittelfußköpfchens empfohlen hat, und im Jahre 1881 Re-verdin eine Keilresektion mit Exostosenabmeißelung angab. Schede beschrieb im Jahre 1904 eine Weichteilplastik mit Abmeißelung der Exostose, auch er fügte später eine Keilosteotomie hinzu. 1918 machte Ludloff seine Schrägosteotomie bekannt, 1921 die Keilosteotomie mit einer entsprechenden Weichteilplastik. 1925 gab Payr seine Weichteilplastik an, die in erster Linie auf einer Lösung der äußeren, fehlerhaft einwirkenden Bänder beruht. Schließlich veröffentlicht 1929 Brandes seine $\frac{2}{3}$ -Resektion des Großzehengrundgliedes im Gegensatz zu Alsberg, der eine vollständige Entfernung des Großzehengrundgliedes empfahl.

Es würde zu weit führen, alle diese blutigen Behandlungsverfahren einzeln zu beschreiben; egehen möchte ich nur auf die, welche in der Chirurgischen Klinik in Göttingen angewandt wurden:

1. Abmeißelung der Exostose.
2. Die Schrägosteotomie des ersten Mittelfußknochens nach Ludloff.
3. Die Keilosteotomie des ersten Mittelfußknochens nach Hohmann
4. Die $\frac{2}{3}$ -Resektion des proximalen Großzehengrundgliedes nach Brandes.

Um die in den letzten Jahren an der Göttinger Chirurgischen Klinik angewandten blutigen Behandlungsverfahren hinsichtlich ihrer Dauerresultate nachzuprüfen, habe ich eine Nachuntersuchung der in der Zeit von 1912-1935 behandelten Fälle von Hallux valgus vorgenommen. Der Wert dieser Nachprüfung mag darin erblickt werden, daß die Eingriffe am gleichen Krankenhaus ausgeführt wurden und so besser zu einem Vergleich herangezogen werden können. Außerdem liegt eine längere Zeit nach der Ausführung der Behandlung zurück, so daß die Beurteilung der Krankheitsfälle einer endgültigen Stellung-

nahme zu dem Wert des Verfahrens gleichkommt. Von den 100 in Frage kommenden Kranken ließ sich bei 16 Personen der Wohnsitz nicht mehr ermitteln, 15 waren inzwischen gestorben. Insgesamt wurden 69 Personen nachuntersucht. Die Behandlungen sind meist doppelseitig ausgeführt worden; es wurden also zusammen 100 Eingriffe zur Wiederherstellung der Großzehenverbildung bei Hallux valgus vorgenommen. Von diesen 100 Kranken waren 39 Männer und 61 Frauen. Angeblich soll bei 2 Kranken die Hallux-valgus-Verbildung von Geburt an bestanden haben, so wie sie sich bei 2 anderen durch Generationen hindurch vererbt haben soll. Weiter fand ich bei 2 Kranken eine normale Fußstellung und bei 2 anderen einen Hohlfuß. Es sei noch erwähnt, daß 97 Kranke in Leitungsanaesthesie und 3 Kranke in Blutleere, Avertin-Aether-Narkose, behandelt wurden.

Von allen Kranken wurden bei der Nachuntersuchung photographische Bilder, Röntgenaufnahmen und Fußumrisse gemacht. Da mir allerdings durch den Umfang der Tabellen ein Urteil über den Zustand des Kranken in hinreichendem Maße ermöglicht schien, habe ich auf die Mitteilung der Röntgenbefunde verzichtet.

Um die Ergebnisse der Nachuntersuchung übersichtlich darzustellen, habe ich nach der Art der angewandten Behandlungsverfahren 4 Gruppen gebildet und die Angaben bzw. Untersuchungsergebnisse darüber in Tabellen zusammengefaßt.

I. Exostosenabmeißelung.

Befund und Angaben vor der Behandlung.

Nr.	Beruf	Bhdlg. Alter	getrg. Schuhwerk, Fußform	Befund, Krankensch.
1	Rentnerin	69	hoh. Schhwk., Plattfüße, Einlagen.	Mt. 15 J. Entwcklg., lks 40°; rts 45° Fistel. erwb.
2	Rentnerin	46	Halbschh., Plattfüße, Einlagen.	M. 25 J. Entwcklg., bds. 55°, schw Gehschmz., erwb.
3	Landwirtin	42	angen. Halbschh., Plattfüße.	M. 25 J. Entwcklg., bds. 35°, schw entzdl. Gehschmz., erwb.
4	Hausfrau	30	hoh. Schwk., Plattfüße, Einlagen.	M. 45 J. Entwlg., lks. 40°; rts. 55° entzdl. Schleimbt., Schmz., erwb.
5	Arbeiterin	60	Halbschh., gering. Hakenfußstillg., bds.	M. 15 J. Entwcklg., bds. 55°, Gef stf., 2. 5. Zeh. i. Krallenstillg., 1 Mutter u. Brüd. ebf., erwb.
6	Arbeiterin	60	hoh. Schwk., hochgr. Plattfüße, Einlagen.	M. 16 J. Entwcklg., bds. 60°, Gehsch erwb.
7	Bierfahrer	44	hoh. Schhwk.. Plattfüße.	M. 20 J. Entwcklg., bds. 50°, Ballensch erwb.
8	Telefonistin	29	belbg. Schhwk., Platt-Spreizfüße, Einlagen.	M. 15 J. Entwcklg., bds. 50°; Sch Grdglk., Entzdg. lk. Schleimbt. d. 2 nerat. vererbt. erwb.
9	Hausfrau	59	belbg. Schwk.	M. 40 J. Entwcklg., bds. 40°; Schm Grdglk., erwb.
10	Schmlede- meister	27	hoh. Schhwk., Plattfüße, Einlagen.	M. 15 J. Entwcklg., bds. 45°; kirs Exost. lks. geröt, schmzh., erwb.
11	Schneiderin	16	belbg. Schhwk., Plattfüße, Ein- lagen.	M. 15 J. Entwcklg., bds. 55°; Schm Grdglk. bds. b. Gehen, rts. entz erwb.
12	Landwirtin	44	belbg. Schhwk., Plattfüße.	M. 23 J. Entwcklg., bds. 55°; kirs Exost., Schmz. i. Grdglk. b. Gehen erwb.
13	Rentner	68	angen. hoh. Schhwk., hochgrd. Plattfüße, Einlagen.	M. 50 J. Entwlg., bds. stk. Exost. Schmz. b. Gehen, lks. 65°; rts. erwb.

Befund und Ausgaben bei der Untersuchung.

nr.	Zeit von Behandlg. bis Unters.-Tag	Beschwerden und Befund	Urteil des Patienten	kosm. — funkt. Gesamturteil
1	4½ J.	stk. Gehbschwd., Ballen schmerzhaft. H. v. 60° bds., hoh. Sch. m. Einl., Plattf.	nicht gebessert	ungenüg. ungenüg. nicht gebessert Operat. rechts
2	13 J.	stk. Gehbschwd., Ballen schmerzhaft. H. v. 50° bds., angm. Sch. m. Einl., Plattf.	nicht gebessert	ungenüg. ungenüg. bds. nicht gebessert
3	8½ J.	stk. Gehbschwd., gering. Ballen, bds. H. v. r. 30° m. Schwiell.: angm. Halbsch., Platt-Spreizf.	gebessert	genüg. genüg. gebessert, Operat. rechts
4	12 J.	kein. Bschwd. H. v. 30° bds. hoh. Sch. m. Einl., Plattf.	gebessert	genüg. gut bds. gebessert
5	15 J.	gering. Exost. m. Druckschmerz., stk. Gehbschwd. H. v. w. v. d. Operat., blbg. Schwk., Hackenf. bds.	nicht gebessert	ungenüg. ungenüg. bds. nicht gebessert
6	8 J.	stk. Geh- u. Druckbschwd. H. v. w. v. d. Operat., hoh. Schwk. m. Einl., stk. Plattf.	nicht gebessert	ungenüg. ungenüg. bds. nicht gebessert
7	1 J.	Opt. Narb. empfödl., H. v. lk. 30°, ger. Schwiell., blbg. Schwk. m. Einl., Plattf.	gebessert	genüg. genüg. gebessert, Operat. lks.
8	12 J.	stk. Gehbschwd. m. Exost. r.; H. v. 40° r.; w. v. d. Op.; Maßsch.-Fuß- bandg., Platt-Spreizf. bds. r.	nicht gebessert	ungenüg. ungenüg. nicht gebessert Operat. rechts
9	6 J.	schmerzhaft. Exost. r.; gering. Geh- bschwd.; lk. k. bsd. Bschwd.; H. v. bds. 30°; hoh. Schuh.; Plattf. gering. Grad.	gebessert	genüg. genüg. bds. gebessert
0	11 J.	kein. Bewg.-Gewalt ü. d. opt. Zeh; gering. Ballen; H. v. 35°; hoh. Sch.; Plattf.	gebessert	genüg. genüg. gebessert, Operat. lks.
1	11 J.	Exost. u. gering. Bschwd. b. Gehen; H. v. w. v. d. Op.; Maß-Halbsch. m. Einl.; Platt-Spreizf.	gebessert	ungenüg. ungenüg. bds. nicht gebessert
2	3 J.	bds. gering. Druckbschwd. m. gering. H. v.; Maßsch. m. Einl.; Platt-Spreizf. bsd. r.	gebessert	genüg. genüg. bds. gebessert
3	7½ J.	gering. Ballenbildg.; Druckschmerz. gering. Grad. bds., H. v. bds. w. v. d. Op.; Maßsch. m. Einl., Platt-Spreizf. bds.	gebessert	ungenüg. ungenüg. bds. nicht gebessert

Das Verfahren von Schede (Abmeißelung der Exostose, Schleimbeutelentfernung, Bänderraffung kann mit den übrigen Verfahren nicht in Wettstreit treten, weil hierfür nur ausnehmend erhebliche Krankheitsfälle, meist im höheren Lebensalter ausgesucht wurden.

Es kam in den meisten Fällen darauf an, die Exostose mit dem entzündlich veränderten Schleimbeutel zu entfernen. Dementsprechend zeigt auch die Nachuntersuchung, daß nach längeren Jahren von 13 Kranken 7 nichtgebesserte 6 gebesserten gegenüberstehen. Die Verschlechterung der ersten operativen Ergebnisse ist hauptsächlich in der stark zunehmenden Arthritis deformans, wie sie einwandfrei auf fast allen Röntgenbildern nachzuweisen ist, somit in der Insuffizienz des ersten Mittelfußknochens zu suchen.

An Verfahren, die mit einer Besserung der Stellung und mit einer Umstellung der Funktion verbunden sind, wurden in der Klinik die drei Verfahren von Ludloff, Hohmann und Brandes ausgeführt. Auf die vielen Einzelheiten, die bei den Verfahren zu berücksichtigen sind, kann ich hier nicht eingehen, z. B. auf Modifikationen oder Hammerzehenbildung usw. Es soll in erster Linie das Ergebnis der nach diesen Verfahren Behandelten einandergegenübergestellt werden.

II. Das Verfahren von Ludloff, bestehend in der Schrägosteotomie des ersten Mittelfußknochens, scherenförmige Verschiebung der Knochenstücke, Spannung des inneren Bandapparates, wurde in 29 Fällen nachgeprüft.

Angaben und Befund vor der Behandlung

Nr.	Beruf	Bhdlg. Alter	getrg. Schuhwerk, Fußform	Befund, Krankengesch.
14	Arbeiter	20	blbg. Schhwk., Plattfüße	M. 17 J. Entwcklg., lks. 75°; Ballen empfdl. geröt.; H. v. gering. Grad., erwb.
15	Hausfrau	40	blbg. Schhwk., Spreiz-Senkfüße, Einlagen	M. 25 J. Entwcklg. bds. 50°; stk. Ballenbldg. u. Gehschm. bds., erwb.
16	Arbeiterin	25	blbg. Schhwk., hochgrad. Spreiz-Senkf., Einlagen	M. 5 J. Entwcklg., r. gering. Grad., lks. 50°; 2. Zehe n. r. stk. abgewich., erwb.
17	Klempner	40	blbg. Schhwk., Spreiz-Plattfüße	M. 25 J. Entwcklg., lks. 25°; r. 40°; Bwglk. stk. eingesch., erwb.
18	Friseur	37	blbg. Schhwk., Senkfüße, Einlagen	M. 17 J. Entwcklg., bds. 60°; stk. Exost., stk. Gnbschw., entzünd.; erwb.
19	Kontoristin	26	Maßschh., Plattfüße, Einlagen	M. 14 J. Entwcklg., bds. 45°; Exost. bds., 2.—5. Z. stk. abgew., erwb.
20	Telefonistin	29	blbg. Schhwk., Einlagen	M. 15 J. Entwcklg., bds. 40°, m. Schmz. u. Gehbschw. i. Grundgelk., erwb.
21	Lagerhalterin	27	blbg. Schhwk., Plattfüße, Einlagen	M. 16 J. Entwcklg., bds. 45°, m. Exost. u. Gehbschw., erwb.
22	Haustochter	46	blbg. Schhwk., Spreizfüße	M. 19 J. Entwcklg., bds. 45°, mit Ballenbldg. u. Schmz. b. Gehen, erwb.
23	Hausfrau	25	blbg. Schhwk., Spreizfüße, Senkfüße	M. 20 J. Entwcklg., r. 30°, o. Besdht.; lks. 50°; schmzh. Gehbschw., erwb.
24	Kaufmanns-frau	29	blbg. Schhwk., Plattfüße, Einlagen	M. 10 J. Entwcklg., r. 40°, lks. 50°; bds. Ballenbldg. u. Gehschmz., erwb.
25	Krankenschwester	31	Halbschh., gering. Plattfüße, Einlagen	M. 25 J. Entwcklg., bds. 45—50°; Exost. schmzh., schwielg., erwb.
26	Landwirt	30	blbg. Schhwk., Spreiz-Senkfüße	M. 10 J. Entwcklg., bds. 40°; gering. Ballenbldg., Gehschmz., erwb.
27	Hausmädchen	16	Halbschh. m. Einlagen, Plattfüße	M. 13 J. Entwcklg., bds. 50°; stk. Exost. m. Geh- u. Druckschmz., erwb.
28	Arbeiterin	16	blbg. Schhwk., Spreiz-Senkfüße	M. 3 J. Entwcklg., bds. 50°; stk. Ballenbldg., Gehschmz., erwb.
29	Arbeiter	49	blbg. Schhwk., Platt-Knickfüße	M. 30 J. Entwcklg., bds. 50°; m. kirschgr. Ballen u. Schwiel., erwb.
30	Schweizer	56	blbg. Schhwk., Platt-Knickfüße	M. 10 J. Entwcklg., bds. 46—50°; Ballen schmzh., Hammerstillg. 2. 3. Z. bds., erwb.
31	Metzger	21	blbg. Schhwk., angeb. Klumpf. (ausgeheilt) Platt-Knickf.	M. 20 J. Entwcklg., lks. 30°, r. 50°, Glk. steif, 2.—5. Z. i. Hammerstillg., erwb.
32	Arbeiter	39	blbg. Schhwk., Hohlf. bds., Spina bifida-Verdacht	M. 15 J. Entwcklg., r. 45°, lks. 60°; schmzh. Ballen, entzünd., erwb.
33	Hausfrau	57	blbg. Schhwk., Plattfüße, Einlagen	M. 55 J. Entwcklg., r. 45°, lks. 60°; bds. schmzh. Ballen, stk. Gehbschw., Ver-lagerg. d. 2. u. 3. Z. bds., erwb.
34	Landwirt	46	hoh. Schhwk., Spreiz-Senkfüße	M. 20 J. Entwcklg., bds., r. stk. etwa 50° m. empfdl. Exost., erwb.

Nr.	Beruf	Bhdlg. Alter	getrg. Schuhwerk, Fußform	Befund, Krankengesch.
35	Haustochter	26	belbg. Schhwk., Platt-Knickfüße	M. 20 J. Entwöklg., bds. 50°; äuf. F. gehob., schmzh. Ballen- u. Gehbschw. erwb.
36	Arbeiter	34	belbg. Schhwk., Plattfuß lks.	M. 30 J. Entwöklg., lks. 45° m. em. Exost., Gehbehind., erwb.
37	Hausfrau	32	belbg. Schhwk., Platt-Knickfüße	M. 12 J. Entwöklg., bds. 45°; lks. Ex. Gehbehindg., erwb.
38	Kellnerin	26	Halbschh., Platt-Knickfüße	M. 8 J. Entwöklg., bds. 45—50°; B. gegd. schmzh., Gehbschw., erwb.
39	Wirtin	37	belbg. Schhwk., Plattfüße	M. 15 J. Entwöklg., bds. 50—55°; s. Exost., Bewgkt. i. Grundgelk. eing. Gehbschw., erwb.
40	Arbeiter	30	belbg. Schhwk., Platt-Spreizfüße	M. 25 J. Entwöklg., bds. 50—60° m. Ballen, entzünd., Gehschmz., erwb.
41	Zimmermann	46	belbg. Schhwk., Plattfüße	M. 35 J. Entwöklg., lks. 65°; stk. B. schmzh., Gehbhdg., r. 40°, erwb.
42	Student	19	belbg. Schhwk., Plattfüße, Einlagen	M. 15 J. Entwöklg., bds. 50—55°; B. i. r. Grundglk. eingeschr., Ballen schm. erwb.

Angaben und Befund bei der Untersuchung

Nr.	Zt. von Bhdlg. — Unts.-Tg.	Beschwerden u. Befund	Urt. d. Pat.	Gesamturteil	
				kosm.	funkt.
14	6½ J.	stk. Schmz. u. d. Mittelf. bsd. lks., recid. m. Exost. v. 45°; blbg. Schhwk., Plattf.	nicht gebessert	ungenüg. nicht gebessert Operat. lks.	ungenü.
15	7 J.	Schmz. unt. Mittelf. bds. gering, H. v. bds. 40°; gering. Exost., lk. Großz. berührt n. d. Bod., Halbschh. m. Maß-einl., Plattf.	gebessert	l. ungenüg. r. genüg. bds. gebessert	genü. genü.
16	3½ J.	k. wesentl. Störgn. bds., Schwiel. unt. 2.—5. Z., H. v. f. ausgegl., Maßschh. m. Einl., stk. Plattf.	nicht gebessert	genüg. gebessert Operat. lks.	genü.
17	3 J.	Bschwd. u. Befund w. v. d. Opt., hoh. Schhwk., z. Tl. m. Einlagen, Spreiz-Plattf.	gebessert	genüg. nicht gebessert Operat. rechts	ungenü.
18	7 J.	Schmz. u. Schwiel. u. Mittelf. bds., r. gering. H. v. m. Exost., belbg. Schhwk. m. Einl., Senkf.	gebessert	genüg. bds. gebessert	genü.
19	12½ J.	stk. Bschwd. u. d. Mittelf., Glkbwg. aufgeh., H. v. recid. bds., belbg. Schhwk. m. Einl., Plattf.	nicht gebessert	ungenüg. bds. nicht gebessert	ungenü.

Nr.	Zt. von Bhdlg. — Unts.-Tag	Beschwerden u. Befund	Urt. d. Pat.	Gesamturteil	
				kosm.	— funkt.
20	12 J.	Bschwd. u. Befund w. v. d. Op. (recid.), Sohlenschmz., Maßsch., Senkf. gering. Grad. I.	nicht gebessert	ungenüg. nicht gebessert Operat. lks.	ungenüg.
21	3½ J.	Ballengeg. schmzh., Schw. u. 2.—5. Z. bds., H. v. f. ausgegl. bds., belbg. Schhwk. m. Einl., Plattf.	gebessert	genüg. bds. gebessert	genüg.
22	8½ J.	stk. Schwielen, bsd. u. r. Mittelf. u. 2.—5. Z., lk. Z. n. a. d. Bod., H. v. f. ausgegl., angem. Schhwk. m. Einl., Senkf.	gebessert	genüg. bds. gebessert	genüg.
23	15 J.	k. wesentl. Stör. tr. gering. H. v.-Bild., lk. f. recid., Ballen empfdl., hoh. Schhwk. m. Einl., Platt-Knickf.	gebessert	ungenüg. bds. gebessert	genüg.
24	3½ J.	lk. recid., Bschwd. w. v. d. Op., r. f. ausgegl., Schwielen u. 2.—5. Z., angem. Schhwk. m. Einl., Plattf.	r. gebessert l. nicht gebessert	r. genüg. l. ungenüg. gebessert Operat. rechts	genüg. ungenüg.
25	4 J.	Op. Narb. lk. schmzh., gering. Ballenbildg. bds., Krallstlg. beid. Großz. m. Schwielen, Halbschh. m. Einl., Plattf.	gebessert	genüg. bds. gebessert	genüg.
26	2 J.	Glk. verdickt, r. gering. Ballenbildg., Schwielen zw. 2. u. 3. Z., H. v. f. ausgegl., belbg. Schhwk. m. Einl., Spreiz-Senkf.	gebessert	genüg. bds. gebessert	genüg.
27	2 J.	lk. ideal, r. H. v. mittl. Grad., schmzh. Ballen, Schmz. u. d. Mittelf., belbg. Schhwk. m. Einl., Plattf.	gebessert	l. genüg. r. ungenüg. bds. gebessert	genüg. genüg.
28	4 J.	gering. Bschwd. u. d. Mittelf., Grundglk. verdickt, gering. Gelkeinschr. bds., belbg. Schhwk. m. Einl., Plattf.	gebessert	genüg. bds. gebessert	genüg.
29	7 J.	Bschwd. u. Befund w. v. d. Op. (2. Z. bds. v. d. Op. exartikul.), belbg. Schhwk., Platt-Knickf.	nicht gebessert	ungenüg. bds. nicht gebessert	ungenüg.
30	10 J.	Bschwd. u. Befund w. v. d. Op., belbg. Schhwk., Platt-Knickf.	nicht gebessert	ungenüg. bds. nicht gebessert	ungenüg.
31	5 J.	gering. H. v., Schwielen u. d. Mittelf., lk. H. v. stk. geword., belbg. Schwk., Platt-Knickf.	gebessert	genüg. gebessert Operat. rechts	genüg.
32	3 J.	r. H. v. f. ausgegl. o. wesentl. Bschwd., lks. Bschwd. u. Bef. w. v. d. Op., belbg. Schhwk., Hohlj. bds.	l. n. geb. r. geb.	l. ungenüg. r. genüg. r. geb.	ungenüg. genüg. l. nicht geb.
33	3 J.	stk. Schmz. d. Ballen- u. Mittelf.-Geg., Beweglkt. i. Grdglk. bds. angeh., belbg. Schhwk. m. Einl., Platt-Spreizf.	nicht gebessert	ungenüg. bds. nicht gebessert	ungenüg.

Nr.	Zt. von Bhdlg. — Unts.-Tag	Beschwerden und Befund	Urt. d. Pat.	Gesamturteil	
				kosm.	— funkt.
34	2 J.	stk. Schwiel. u. Mittelf., Beweg. i. Glk. aufgeh., H. v. w. v. d. Op., hoh. Schhwk. m. Einl., hochgrad. Plattf.	nicht gebessert	ungenüg. nicht gebessert Operat. rechts	ungen
35	2 J.	lks. gering. Ballen, schmzh. Grdglk. verdickt, Schwiel. u. 2. u. 3. Mittelfkn. bds., lks. H. v. mittl. Gr., belbg. Schhwk., Platt-Knickf.	gebessert	genüg. bds. gebessert	ger
36	4 J.	Beschwd. w. v. d. Op., H. v. f. ausgegl., Schwiel. a. Grdglk., gr. Z. berührt n. d. Bod., Beweg. = 0, belbg. Schhwk., Plattf., bsd. lks.	nicht gebessert	genüg. gebessert Operat. links	ungen
37	2 J.	H. v. f. ausgegl., bds. gering. Schwiel. u. d. Mittelf., belbg. Schhwk. m. Einl., Platt-Knickf.	gebessert	genüg. bds. gebessert	ger
38	11 J.	H. v. f. ausgegl. bds., gering. Exost. m. Druckschmz., Schwiel., Halbschh. m. Einl., Platt-Knickf.	gebessert	genüg. bds. gebessert	ger
39	11 J.	Schmz. u. d. Mittelf. bds., H. v. bds. 40°, Schwiel. u. 2.—5. Z., belbg. Schhwk. o. Einl., Plattf.	gebessert	ungenüg. bds. gebessert	ger
40	8 J.	H. v. 30—40° bds. m. Ballen u. Schwiel., gering. Schmz. u. Mittelf. bds., sonst o. B., belbg. Schhwk. m. u. o. Einl., Platt-Spreizf.	gebessert	ungenüg. bds. gebessert	ger
41	9½ J.	H. v. gering. Exost., Ballen u. Grdglk. stk. schmzh., schwielg., beliebg. Schhwk., Plattf.	nicht gebessert	genüg. nicht gebessert Operat. links	ungen
42	6½ J.	H. v. Recid. bds., Ballen u. Mittelf., Schmz. m. gering. Exost. bds., Großz. liegt n. a. d. Bod., angem. Schh., Plattf.	nicht gebessert	ungenüg. bds. nicht gebessert	ungen

Das Krankengut setzt sich folgendermaßen zusammen:

In 11 Fällen handelt es sich um einen mittleren, in 18 um einen erheblichen Befund. Die Untersuchung nach hauptsächlich 4 bis 12 Jahren — nur einige wenige wurden nach 2 Jahren untersucht — ließ folgendes Bild erkennen: Subjektiv waren 17 gebessert, 12 nicht gebessert, objektiv waren funktionell 17 genügend, 12 ungenügend. Kosmetisch waren 16 genügend, 13 ungenügend. Das ergibt bei der Gesamtbeurteilung ein Verhältnis von 18 gebesserten gegenüber 11 nicht gebesserten bzw. verschlechterten. Der Grund für die ungenügende funktionelle Besserung liegt darin, daß durch die Rückverlagerung des Grundgelenkes eine vermehrte Belastung des Mittelfußes erfolgt, außerdem darin, daß die Umbildungsvorgänge am Grundgelenk in keiner Weise günstig beeinflußt werden.

Der Röntgenbefund bei den nachuntersuchten Kranken war natürlich je nach dem Grade der Besserung verschieden. Es ließ sich aber nachweisen, daß bei den gebesserten Fällen der erste Fußstrahl eine gewisse Streckung eingenommen hatte und der Gelenkspalt nicht völlig frei schien. Bei den nicht gebesserten bzw. wenig gebesserten Fällen war der erste Mittelfußknochen deutlich nach innen verlagert, der Abstand zwischen dem zweiten und ersten Mittelfußknochen vergrößert, der Mittelfuß verbreitert, die Großzeh-Grundgelenkverbindung weiter nach außen verschoben und das Gelenk zum Teil mehr oder weniger verbildet. Die Sesambeine waren in den schweren nicht gebesserten Fällen deutlich im Knochenzwischenraum zu sehen.

III. Das Hohmannsche Verfahren ist in der Ausführung schwieriger als die bisherigen. Um die fehlerhafte Stellung des ersten Mittelfußknochens zu beseitigen, führt er eine Osteotomie aus, die keilförmig „extraartikulär“ hinter dem ersten Mittelfußköpfchen angelegt wird. Die Basis des Keiles wird nach der Innenseite gelegt, wobei sich die Größe nach dem Grade der Valgusstellung richtet. Durch diese Osteotomie wird aber nicht allein die fehlerhafte Stellung des ersten Mittelfußknochens, sondern auch die fehlerhafte Drehung um die Längsachse beseitigt. Schließlich führt er, um den nach unten verlagerten Muskel Abduktor hallucis an seine normale Stelle wieder zu befestigen, eine Muskelverlagerung aus.

Angaben und Befund vor der Behandlung.

Nr.	Beruf	Bhdlg. Alter	getr. Schuhwerk, Fußform	Befund, Krankengesch.
43	Arbeiter	21	hoh. Schhwk., Plattfüße, Einlagen.	M. 11 J. Entwcklg., bds. 50°; 2. Z. überlag. Schwiell., kirschgr. Exost. erwb.
44	Beamtenfrau	41	angem. Schhwk., Plattfüße.	M. 12 J. Entwcklg., bds. 50—60°; sch. Ballen mt. Schwiell., erwb.
45	Beamtenfrau	37	belbg. Schhwk., Platt-Knickfüße.	M. 18 J. Entwcklg., bds. 45—50°; sch. schmzh., gering. Schwiell. bsd. r., erwb.
46	Melker	19	belbg. Schhwk., Platt-Spreizfüße, Einlagen.	M. 14 J. Entwcklg., bds. 50—60°; lenbildg. schmzh., 2. Z. überlag. bds. erwb.
47	Bergmanns- frau	31	hoh. Schhwk., Platt-Knickfüße, Einlagen.	M. 17 J. Entwlg., bds. 60—65°; sch. schmzh., schwielg., erwb.
48	Kaufmanns- frau	24	belbg. Schhwk., Plattfüße, Einlagen.	M. 14 J. Entwcklg., bds. 50°; Ham. 2.—5. Z., erwb.
49	Kaufmanns- frau	37	belbg. Schhwk., Platt-Knickfüße.	M. 36 J. Entwcklg., r. 55°; lks. gen. Exost. schmzhf., erwb.
50	Ober	20	belbg. Schhwk., Platt-Knickfüße.	M. 5 J. Entwcklg., bds. 50°; B. schmsh., schwielg., 2. Z. Krallenn. erwb.
51	Arbeiterin	31	belbg. Schhwk., Platt-Knickfüße.	Bds. 50°; kirschgr. Exost. schmzh. rts. fistelnd, angeb.
52	Schneiderin	23	angem. hoh. Schhwk., Platt-Knickfüße, Einlagen.	M. 15 J. Entwcklg., bds. 45—55°; lang. Großz., 2. Z. i. Krallenstllg. erwb.
53	Stellmacher	19	belbg. Schhwk., Platt-Spreizfüße.	M. 3 J. Entwcklg., lks. 45° r. gen. Ballen schmzh. b. Gehen, erwb.
54	Betriebsleiter	35	belbg. Schhwk., Plattfüße.	M. 20 J. Entwcklg., lks. 50°; r. gen. Ballen schmzh., Gehbschwd. erwb.

Angaben und Befund bei der Untersuchung.

Nr.	Zt. von Bhdlg. — Unts.-Tag	Beschwerden und Befund	Urt. d. Pat.	Gesamturteil	
				kosm.	— funkt.
13	6½ J.	Beschwd. u. Befund w. v. d. Op., angem. Schhwk. mt. Einlag., Plattf.	nicht gebessert	ungenüg. bds. nicht gebessert	ungenüg.
14	7 J.	H. v. bds. f. ausgegl., stk. Schwiel. ü. u. unt. d. Zeh. belbg. Schhwk. m. Einlag., Plattf.	gebessert	genüg. bds. gebessert	genüg.
15	2½ J.	H. v. f. ausgegl., lks. stk. Schwiel. a. Grdgk., r. gering., Exost., belbg. Schhwk. mt. Einl., Platt-Knickf.	gebessert	genüg. bds. gebessert	genüg.
16	1½ J.	Bschwd. u. Befund w. v. d. Op. Recidiv bds., belbg. Schhwk. Platt- Spreizf.	nicht gebessert	ungenüg. bds. nicht gessert	ungenüg.
17	1½ J.	Bschwd. u. Befund w. v. d. Op. Ballenschmz. u. Gehbehindg., Schwiel., hoh. Schhwk. mt. Einlag., Platt- Knickf.	nicht gebessert	ungenüg. bds. nicht gebessert	ungenüg.
18	5 J.	Beschw. u. Befund w. v. d. Op. (Recidiv bds.) schmzh. Schwielen u. 2.—5. Mittelfkn., belbg. Schhwk., Platt-Spreizf.	nicht gebessert	ungenüg. bds. nicht gebessert	ungenüg.
19	7½ J.	keine wesentl. Stör., Exost. stk. schwielig., belbg. Schhwk. mt. Einl., Plattf.	gebessert	ungenüg. gebessert Operat. rechts	genüg.
20	5½ J.	Beschw. u. Befund w. v. d. Op. Druckempfdl. Ballen, schwielig. schmzh., angem. z. T. belb. Schhwk. m. Einl., Platt-Knickf.	nicht gebessert	ungenüg. nicht gebessert Operat. rechts	ungenüg.
21	2 J.	stk. Beschw. a. Ballen, Gehbschwd. f. w. v. d. Op., belbg. Schhwk., Platt- Knickf.	nicht gebessert	ungenüg. bds. nicht gehessert	ungenüg.
22	7½ J.	Ballengegd. verdickt, empfdl. Schmz. b. Gehen, fest. hoh. Schhwk., Platt- Knickf.	gebessert	genüg. bds. gebessert	genüg.
23	5 J.	H. v. f. ausgegl., gering. Schmz. a. opert. Ballen, schwielig., hoh. fest. Schhwk. mt. Einlag., Platt-Spreizf.	gebessert	genüg. gebessert Operat. links	genüg.
24	4 J.	H. v. f. ausgegl. k. wesentl. Stör., angem. Schhwk. mt. Einl. Plattf.	gebessert	genüg. gebessert Operat. links	genüg.

Dieses Verfahren, das wohl die fehlerhaften Veränderungen am besten berücksichtigt, hat auf Grund obiger Nachuntersuchungen nicht das gehalten, was man von ihm erwartet hat. Nach dem Verfahren von H o h m a n n wurden 20 Fälle behandelt. Der Nachuntersuchungsbefund läßt erkennen, daß sowohl subjektiv als auch objektiv und auch kosmetisch das Verhältnis der Gebesserten zu den Nichtgebesserten 50:50 beträgt.

Die Ursache liegt nach unseren Fällen darin, daß

1. häufig ein Recidiv beobachtet wird,
2. die Insuffizienz des ersten Mittelfußknochens durch das Behandlungsverfahren vermehrt wurde,
3. frühzeitig die Bildung einer Arthritis deformans einsetzt bzw. das Fortschreiten der Arthritis deformans nicht gehemmt wird.

Das Röntgenbild läßt bei den nicht gebesserten bzw. wenig gebesserten Fällen eine Arthritis deformans erkennen. Der erste Mittelfußknochen ist wieder nach innen abgewichen, die Valgusstellung der Großzehe ist z. T. noch verstärkt und die Gelenkverbindung des Großzehen-Grundgelenkes liegt an dem Außenköpfchen des ersten Mittelfußknochens. Die Sesambeine liegen im Knochenzwischenraum. Selbst bei einigen gebesserten Fällen ließ sich eine geringe Arthritis deformans mehr oder weniger erkennen.

VI. Brandes behandelte bis 1926 nach der von ihm angegebenen Veränderung von Ludloff. Von da ab führte er nur sein 1929 veröffentlichtes Behandlungsverfahren ($^{2/3}$ -Resektion des Großzehengrundgliedes) aus.

Mit einem Schnitt von der Mitte des Großzehengrundgliedes bis zur Mitte des ersten Mittelfußknochens reichend - etwa über die Mitte des Großzehengrundgelenkes gehend - umkreist er die Exostose und legt Knochen und Gelenk frei. Dann wird die Exostose des ersten Mittelfußknochens abgemeißelt, das Großzehengrundglied von den Weichteilen freigelegt und zu $^{2/3}$ entfernt. Das übriggebliebene Drittel wird geglättet und die Wunde schichtweise geschlossen.

Angaben und Befund vor der Behandlung.

r.	Beruf	Bhdlg.	getrg. Schuhwerk, Fußform	Befund, Krankengesch.
5	Arbeitsfrau	47	belbg. Schuhwk., Plattfüße, Einlagen.	M. 15 J. Entwcklg., bds. 45—50°; lks. bsd. stk. Ballen, schwielig. schmzh. erwb.
5	Bierfahrer	44	hoh. fest. Schhwk., Platt-Knickfüße.	M. 26 J. Entwcklg., bds. 50°; stk. Schmz., erwb.
7	Steinrichter	21	belbg. Schhwk., Hohlfüße.	M. 8 J. Entwcklg., rts. 45°; lks. 55° schmzh., Hammerzehbildg., erwb.
3	Landarbeiter	16	belbg. Schwk., hochgrad. Platt-Knickfüße.	M. 8 J. Entwcklg., bds. 55°; schmzh. Hammerstellg. d. gr. Zehe, erwb.
9	Stütze	32	belbg. Schhwk., Plattfüße, ohne u. mt. Einlagen.	M. 10 J. Entwcklg., lks. 55°; gering. Exost.; rts. 70° Wallnußgr. Exost. empfdl., geröt., erwb.
0	Holz- bildhauer	39	hoh. Schhwk., Platt-Knickfüße.	M. 18 J. Entwcklg., lks. 50°; rts. gering. Ballen, schmzh., erwb.
	Gemeinde- diener	51	hoh. Schhwk., Platt-Knickfüße.	M. 20 J. Entwcklg., rts. 60° Exost., Fiestel; lks. 45° Exost. gering; bds. entzünd.; erwb.
2	Hausfrau	35	belbg. Schhwk., Platt-Knickfüße.	M. 20 J. Entwcklg., bds. 50°; Exost. schmzh., Bewegg. eingeschrkt., erwb.
3	Arbeiterin	23	belbg. Schhwk., Fußform normal.	M. 15 J. Entwcklg., lks. 50°; Ballen gering. Exost.; erwb.
4	Schüler	14	angem. Schhwk., Plattfüße, Einlagen.	angeb. H. v. u. Klumpfuß angeb. rts. hochgr. H. v., lks. 60°; Ballen schmzh.
5	Hausfrau	43	belbg. Schhwk., Plattfüße.	M. 5 J. Entwcklg., rts. 60° mt. Wallnußgr. Ballen, lks. H. v. geringer, erwb.
5	Tischler	22	belbg. Schhwk., gering. Plattfüße.	M. 8 J. Entwcklg., rts. 45°; lks. 60°; Ballen entzünd., erwb.
7	Maurer	19	belbg. Schhwk., Plattfüße.	M. 6 J. Entwcklg., bds. 50—60°; Haselnußgr. Exost. bds., schwielig. verändert, stk. Gehschmz. bds., erwb.
3	Beamtenfrau	60	angem. Schhwk., Platt-Spreizfüße, Einlagen.	M. 20 J. Entwcklg., rts. stärker, lks. gering., gering. Ballen, ander. Zehen i. Krallenstellg., erwb.
9	Arbeiterin	20	belbg. Schhwk., Platt-Knickfüße.	M. 4 J. Entwcklg., lks. 65°; rts. geringer, Ballen geröt., entzünd., erwb.

Angaben und Befund bei der Untersuchung

Nr.	Zt. von Bhdlg. — Unts.-Tag	Beschwerden u. Befund	Urt. d. Pat.	Gesamturteil kosm. — funkt.	
55	1½ J.	H. v. ausgegl., Grzehen verkürzt, Hautfalt. zw. gr. Z. u. 2. Z., hoh. Schhwk. m. Gummistrmpf., Plattf.	gebessert	genüg. bds. gebessert	genü
56	1 J.	H. v. ausgegl., Schlotterz., Narbe empfdl., aktiv. Bewglkt. aufgeh., einf. Schhwk., Platt-Knickf.	nicht gebessert	ungenüg. nicht gebessert Operat. rechts	ungenü
57	8 Mon.	H. v. ausgegl., Ballengegd. empfdl., schwielg., belbg. Schhwk., Hohlf.	gebessert	genüg. gebessert Operat. lks.	genü
58	1¼ J.	gering. H. v. m. Ballenbldg., bds. empfdl., schl. Gehen, Schmz. i. Grdglk., belbg. Schhwk., Platt-Knick..	gebessert	genüg. bds. gebessert	genü
59	1 J.	H. v. f. ausgegl., rchts. gering. Ballen, Schwiel. a. Grdglk. bds., belbg. Schh- wk., Plattf.	gebessert	genüg. bds. gebessert	genü
60	½ J.	H. v. ausgegl., Grdglk. noch geschwol., empfdl.; hoh. Schhwk. m. Einl., Platt- Knickf.	gebessert	genüg. gebessert Operat. lks.	genü
61	5 J.	H. v. ausgegl., gering. Druckschmz. a. bd. Ballengegd., Bewglkt. d. bds. Grd- glk. aufgeh., übr. Z. i. Hammerstillg., fst. Schhwk. m. Einl., Platt-Knickf.	gebessert	genüg. bds. gebessert	ungenü
62	1 J. 2 Mon.	H. v. bds. ausgegl., vol. u. dors. stk. Schwiel., Halbschw. m. Einl., Platt- Knickf.	gebessert	genüg. bds. gebessert	genü
63	8 J.	Deformität ausgegl., schmzh. Ballen u. empfdl. Schwiel. u. d. Mittelf., belbg. Schhwk. m. Einl., Fußf. normal.	gebessert	genüg. gebessert Operat. lks.	genü
64	5½ J.	H. v. ausgegl., gering. Ballen bds., belbg. Schhwk., Plattf.	gebessert	genüg. bds. gebessert	genü
65	5½ J.	H. v. ausgegl., Schwiel. u. Empfdlkt. a. Grz., Grdglk., belbg. Schhwk., Plattf.	gebessert	genüg. gebessert Operat. rechts	genü
66	5½ J.	Schwiel. u. d. Mittelf., Narbe empfdl., sonst k. Stör., einf. Schhwk., gering. Plattf.	gebessert	genüg. bds. gebessert	genü
67	5½ J.	Druckschmz. üb. d. 2. Zehe u. stk. Schwiel. bds., belbg. Schhwk., Plattf.	gebessert	genüg. bes. gebessert	genü
68	2 J.	gering. H. v. bds., stk. Bschwd. üb. d. Ballen, schl. Gehfähgkt., stk. Schwiel., Gehschmz., angem. Schhwk. m. Einl., Platt-Spreizf.	nicht gebessert	genüg. bds. nicht gebessert	ungenü
69	4 J.	r. k. wesentl. Stör., lks. gering. Ballen, empfdl., stk. Schwielenbldg. u. d. Mittelf., belbg. Schhwk., Platt-Knickf.	gebessert	genüg. bds. gebessert	genü

26

Nach dem Verfahren von Brandes wurden 25 Kranke behandelt, 15 wurden nachuntersucht. Das Verhältnis von mittelschwer zu erheblich beträgt 6:9. Die Besserung ist sowohl subjektiv als auch objektiv recht günstig. Kosmetisch ist das Verhältnis 14:1 und subjektiv 13:2.

Wir sehen die Vorteile dieses Verfahrens darin, daß

1. der Mittelfuß unberührt bleibt und somit keine Begünstigung der Insuffizienzerscheinungen erzielt wird,
2. darin, daß eine für die Arthritis deformans wichtige Ursache, nämlich die fehlerhafte Funktion des Großzehengrundgliedes ausgeschaltet wird.

Die Einwände über das kosmetisch schlechte Ergebnis dürften durch das Zahlenverhältnis von 14:1 hinfällig gemacht werden. Funktionell ist ebenfalls ein gutes Ergebnis erzielt worden, d. h. der Kraftschluß ist ausreichend, ebenso die Beweglichkeit.

Das Röntgenbild läßt erkennen, daß sich der erste Mittelfußknochen im Gegensatz zum Stand vor der Behandlung mehr oder weniger seiner normalen Lage genähert hat. Eine Regeneration des Großzehengrundgliedes ließ sich in keinem Fall feststellen. Die arthritischen Veränderungen waren im Gegensatz zu dem Gelenkeingriff gering. Die Sesambeine hatten die fehlerhafte Lage nicht geändert.

Die Verfahren von Ludloff, Hohmann und Brandes, die mit einer Besserung der Funktion verbunden sind, sollen in der folgenden Tabelle noch einmal klar einander gegenübergestellt werden.

	Anz.	♂	♀	Befund		subjektiv		funktionell		objektiv	
				mittel	erhebl.	geb.	nicht geb.	genüg.	ungenüg.	genüg.	kosmetisch ungenüg.
Operation nach Ludloff	29	12	17	11	18	17	12	17	12	16	13
Operation nach Hohmann	12	5	7	7	5	6	6	6	6	5	7
Operation nach Brandes	15	8	7	6	9	13	2	12	3	14	1

Auf Grund unserer Ergebnisse sind wir zu der Stellungnahme gekommen, daß das Verfahren von Brandes bei der Behandlung der Hallux-valgus-Bildung unerreicht ist, daß es vor allen Dingen dann günstige Endergebnisse zeigt, wenn die Bewegung des Grundgelenkes schmerzhaft und eingeschränkt ist.

Zum Schluß sei noch hervorgehoben, daß das so oft angeschuldigte Schlottergelenk bald völlig zurückgeht und das Großzehengelenk somit seine genügend aktive Beweglichkeit zurückerhält.

LITERATURVERZEICHNIS.

- Alsberg: Zbl. Chir. 1924: 2302.
 Zbl. Chir. 1925: 337.
- Bragard: Klin. Wschr. 5 (1926), 44: 1882.
- Brandes: Zbl. Chir. 1929.
- Bromeis: Chirurg 1931: 465.
- Chlumsky: Zbl. Chir. 1924: 178.
- Erlacher: Zbl. Chir. 1928: 977.
- Ewald: Dsch. Z. Chir. 114 (1912): 90.
- Grzwywa: Zbl. Chir. 1926: 1567.
- Hackenbrock: Zbl. Chir. 1925: 2051.
- Haß: Zbl. Chir. 26 (1932): 1561.
- Hagen-Torn: Zbl. Chir. 1928: 3004.
- Herzberg: Arch. klin. Chir. 129 (1924): 124.
- Heubach: Dsch. Z. Chir. 46 (1897): 245.
- Hohmann: Arch. orthop. u. Unfallchir. 21 (1923): 525.
 Erg. Chir. u. Orthop. 18 (1925): 319.
 Münch. med. Wschr. 1921: 1042.
 Zbl. Chir. 1927: 659.
- Hüter: Klin. Gelenkd. 2 (1927).
- Krumelio: Zbl. Chir. 1931: 8.
- Kruckenberg: Z. orthop. Chir. 1925: 310.
 Zbl. Chir. 1932: 1758.
- König: Grundr. spez. Chir. 613 (1881).
- Kaspar: Bruns Beitr. 157 (1933).
- Lexer: Dsch. med. Wschr. 1917 (1024).
- Lindemann: Zbl. Chir. 1929: 2441.
- Ludloff: Arch. klin. Chir. 110 (1918).
 Zbl. Chir. 45 (1925): 2548.
- Matheis: Z. orthop. Chir. 46 (1925).
 Z. orthop. Chir. 48 (1927).
- Mau-Lauber: Dsch. Z. Chir. 1917.
- Mauclair: Rev. Orthop. 4 (1924): 13, 305.
- Payr: Beitr. klin. Chir. 8 (1894).
 Münch. med. Wschr. 1924: 1081.
 Zbl. Chir. 1925: 2292.
- Pick: Arch. Orthop. u. Unfallchir. 24 (1925): 251.
- Rath: Z. orthop. Chir. 18 (1907): 421.
- Raven: Münch. med. Wschr. 1928.
 Zb. Chir. 1929.

- Riedel: Zbl. Chir. 1886.
v. Salis: Z. orthop. Chir. 46 (1925).
Schanz: Zbl. Chir. 1929: 209.
Schede: Z. orthop. Chir. 46 (1924).
Z. orthop. Chir. 48 (1927).
Zbl. Chir. 1928: 1554.
Schotte: Klin. Wschr. 1929: 50.
Simon: Bruns Beitr. 111 (1918).
Timmer: Zbl. Chir. 1928.
Dsch. med. Wschr. 46 (1928).
Dsch. med. Wschr. 26 (1929).
Ullmann: Wien. med. Wschr. 49 (1894): 2089.
Virchow: Berl. klin. Wschr. 1921.
Virchows Arch. 10 (1856).
Wymer: Zbl. Chir. 52 (1923): 87, 986.
Zbl. Chir. 45 (1924): 2474.

LEBENS LAUF.

Ich, Heinz Bartholomäus, wurde am 20. 11. 1909 als Sohn des Reichsbahnobersekretärs Friedrich Bartholomäus und seiner Ehefrau Alma, geb. Eckardt, in Berga am Kyffhäuser geboren. In Kassel besuchte ich von 1921 bis 1930 die Oberrealschule II und bestand am 22. März 1930 die Reifeprüfung.

Ich war vom Sommersemester 1930 bis zum Wintersemester 1935/36 an der Universität Göttingen immatrikuliert. Während dieser Zeit war ich in dem ersten Semester Hörer der philologischen, in den übrigen 11 Semestern Hörer der medizinischen Fakultät. Am Ende des 5. medizinischen Semesters bestand ich das medizinische Vor-examen und am 31. Juli 1936 das medizinische Staatsexamen in Göttingen.

Nach dem Staatsexamen war ich vom 1. September 1936 bis 15. April 1937 an dem Knappschafts Krankenhaus in Hettstedt (Süd-harz), und vom 16. April 1937 bis 31. August 1937 an der Landesfrauen-klinik in Erfurt als Medizinalpraktikant tätig.

Nach Erhalt meiner ärztlichen Approbation im September 1937 blieb ich noch sechs Monate als Volontärarzt an der Landesfrauenklinik zu Erfurt. Danach vertrat ich praktische Ärzte in Falkenberg, Schön-heide i. Erzgeb., Bad-Aachen, Krostitz, Hasselfelde, Magdeburg, Kassel und Hannover. Zur Zeit bin ich Assistenzarzt in Magdeburg.